

Q：風邪気味なのですが、接種はできますか？

A：ぐったりしているようなら中止してください。

37.5℃未満の微熱で、元気なら接種できることもあります。

接種当日に来院していただき、医師と相談してください。

Q：卵アレルギーがありますが、接種できますか？

A：当院では接種を行っておりません。かかりつけの内科・小児科にご相談ください。

Q：妊娠中ですが、接種はできますか？

A：当院では接種を行っておりません。かかりつけの産婦人科にご相談ください。

Q：何歳から接種できますか？

A：当院では「卵アレルギーのない、10ヵ月以上の方」の方が接種可能です。

Q：どのくらいで免疫が付きますか？

A：接種後2～4週間くらいからつき始め、効果は約6ヵ月持続します。

Q：13歳未満ですが、1回接種でもいいですか？


A：お子さんは大人に比べて免疫が付きにくいので、2回接種をおすすめします。

Q：2回目の接種はいつくらいにしたらいいですか？

A：1回目の接種日から、2～4週間あけてください。

Q：他の予防接種を受けたのですが、どれくらい間隔をあければいいですか？

A：



Q：溶連菌やおたふくなどにかかっていたのですが、接種はできますか？

A：それぞれ以下の通り間隔をあけてください。

☆麻疹 ⇒ 治癒後4週間以上

☆風疹・水痘・おたふくかぜ・インフルエンザなどのウイルス性疾患 ⇒ 治癒後2～4週間以上

☆風邪・溶連菌感染症・手足口病・RS・アデノ・突発性発疹・りんご病など ⇒ 治癒後1～2週間以上